

## 12 vragen over de Corona booster-injectie van Pfizer, najaar 2023

De [NVKP](#) heeft grote bedenkingen bij het nut en noodzaak van deze nieuwe injectieronde, zowel voor de zogenoemde risicogroepen als voor de gezonde mensen, waaronder jongeren en zwangere vrouwen. De [NVKP](#) vindt het belangrijk dat u goed geïnformeerd uw keuze kunt maken en vooraf alle informatie over mogelijke gevolgen voor uw gezondheid of die van uw (ongeboren)kind kunt inzien. Als [NVKP](#) spreken we van Corona-injectie en niet van vaccinatie. De Corona injectie van Pfizer is gebaseerd op een nieuw type, werkingsmechanisme, om die reden wordt in dit document ook veelal gewerkt met alternatieve termen ‘prik’ of ‘injectie’.

Opmerking: Bij overname van letterlijke tekst (uitspraak van iemand anders) is deze *cursief* weergegeven.

### 1. Ik heb een uitnodiging ontvangen van de GGD om een Corona-prik te halen. Ben ik verplicht om deze te halen/ om op deze uitnodiging in te gaan?

[NVKP](#): Nee, want vaccineren is altijd vrijwillig, het is een keuze, Uw keuze en geen plicht!

### 2. In de uitnodiging staat dat ik een ‘vernieuwd mRNA-vaccin’ krijg, wat betekent dit en welk ‘vaccin’ is dit?

[Rijksoverheid](#): *Bij een mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna), wordt niet het eiwit, maar de code voor productie van het eiwit toegediend. Na een prik, maken jouw eigen cellen het spike-eiwit waartegen je immuun wordt.*

[NVKP](#): Een andere vraag over dit type ‘vaccin’ is of het mogelijk is dat er [DNA wordt gewijzigd](#). [Zweedse onderzoekers](#) hebben vast gesteld dat Pfizers mRNA al 6 uur na injecteren is opgenomen in de levercellen en omgezet naar DNA.

### 3. Waarom ontvang ik bij de uitnodiging geen bijsluiter zodat ik mezelf kan informeren over deze injectie?

[Rijksoverheid](#): *De Nederlandse bijsluiters van de coronavaccins staan bij elkaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).*

[NVKP](#): Wist u dat een arts of verpleegkundige informatieplicht heeft?

Voordat de prik wordt toegediend, behoort de arts of verpleegkundige eerst informatie te verstrekken over de voor- en nadelen en over mogelijke bijwerkingen. Dit heet ‘[informed consent](#)’, dat betekent dat je pas na goed te zijn geïnformeerd toestemming kan geven voor de injectie.

### 4. Er wordt gesproken over een zwart driehoekje welke boven aan de bijsluiter staat. Wij ontvangen deze bijsluiter niet maar wat betekent dit zwarte driekhoekje?

[EMA](#) (Europees Geneesmiddelenbureau): *Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.*

[NVKP](#): De term ‘geneesmiddel’ is niet juist; dit product geneest niet! De zwarte driehoek duidt erop dat nog veel over het middel, met name de lange termijn bijwerkingen, niet bekend zijn omdat het vrij nieuw is.

## 5. Hoe lang ben ik met deze injectie beschermd tegen het Corona-virus?

**EMA:** De duur van de bescherming die het vaccin biedt is **niet bekend**, omdat dit met lopende klinische onderzoeken nog wordt bepaald.

**NVKP:** Het circulerend coronavirus verandert en muteert. Om die reden wordt er ieder jaar een nieuwe Corona- injectie gemaakt. Het natuurlijk doormaken van een Corona-infectie geeft een bredere en langdurige bescherming.

## 6. Ik ben zwanger, is de Corona-prik veilig voor mij en mijn baby?

**EMA:** Comirnaty (Red. Pfizer injectie) kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

**NVKP:** Er zijn bij het [Lareb](#) 231 meldingen binnengekomen van spontane miskramen, en 6 meldingen van foetale dood na injecteren met de COVID-19 prik van Pfizer. (27-09-2023)  
Vaccineren tijdens de zwangerschap is niet aan te raden.

Enkele voorbeelden van de [5.040](#) (15-09-2023) voorvallen van miskramen/dodgeboren baby's, gemeld bij VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting USA).

- [Bevallen van een niet-levensvatbare vrouwelijke foetus na 29 weken zwangerschap.](#) Bij de 1<sup>ste</sup> dosis van het COVID19-vaccin, 2 dagen later verminderde beweging van de baby. Op 26-12-2020 bleek de baby geen hartslag meer te hebben.
- [Baby, doodgeboren.](#) Met 18 weken zwangerschap gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Zwangerschap was tot die tijd volkomen normaal.
- [Injectie met Pfizer bij 8 weken zwangerschap,](#) 2 weken erna eerste bloedverlies, subchorionisch hematoom. Tweede injectie in februari en 1 week later, bij 12 weken zwangerschap, had de foetus geen hartslag meer.

**Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde:** Zwangere vrouwen met COVID-19 vertonen een grote verscheidenheid aan symptomen, die vergelijkbaar zijn met die van niet-zwangeren. Het lijkt er niet op dat zwangeren ernstiger door de ziekte worden getroffen.

## 7. Ik geef borstvoeding, heeft het nadelige gevolgen voor mijn baby als ik ben geïnjecteerd met deze prik?

**EMA:** Er worden geen effecten op met moedermelk gevoede pasgeborenen/zuigelingen verwacht.

**EudraVigilance:** Via de moedermelk doorgegeven aan de zuigeling  
**Baby, 1-jaar:** Peeling (ontveling) van de huid op de handen en voetzolen.  
Aanvullende informatie: [Artsen Collectief](#)

**NVKP:** vaccineren tijdens de borstvoedingsperiode is ook niet aan te raden.

## 8. Waar kan ik over de bijwerkingen van de Corona-prik lezen anders dan bij het Lareb?

[Rapport Pfizer documenten](#); met daarin meldingen van 900 uiteenlopende bijwerkingen!  
[Vrijspreker](#) :Turbokanker en de spuiten.

**NVKP** : lees altijd goed de [bijsluiter!](#)

Voor meer informatie kunt u terecht op [NVKP](#) , [Corona dossier](#) , [Vaccindocumenten](#) , [Bijwerkingenlijst](#).

## 9. Zijn er van de Corona-prik effecten te verwachten op lange termijn?

Lareb: tot nu toe zijn er geen effecten bekend!

NVKP: Onderzoek naar de lange termijn effecten wordt te weinig en niet serieus genoeg gedaan.

## 10. Heb ik na het doormaken van een Corona-infectie meer kans op een bijwerking na een Corona-prik?

Lareb: Uit onderzoek blijkt dat mensen die eerder COVID-19 hebben gehad vaker en heviger bijwerkingen van een coronavaccinatie kunnen ervaren.

## 11. Welke bijwerkingen zijn er, op dit moment bekend bij het ‘vaccineren’ tegen Covid met Comirnaty?

EMA: Voorvallen van anafylaxie zijn gemeld. Medisch toezicht en een gepaste medische behandeling moeten altijd onmiddellijk beschikbaar zijn..

*Er is een verhoogd risico op myocarditis en pericarditis na vaccinatie met Comirnaty...dit word vaker waargenomen na de 2de vaccinatie, en vaker bij jongens en jonge mannen. De beschikbare gegevens wijzen erop dat de meeste gevallen herstellen. In sommige gevallen was ondersteuning op de intensive care nodig en er zijn fatale gevallen waargenomen...*

Hugo de Jonge: bijwerkingen nemen toe naarmate je meer prikken hebt gehad.

NVKP: Het gaat om uiteenlopende bijwerkingen en mogelijk met fatale afloop. Een potentieel dodelijk ‘geneesmiddel’ zou per direct van de markt moeten worden gehaald!

## 12. Kan deze prik tegelijk worden ingespoten met een ander vaccin, bijvoorbeeld een kindervaccin volgens het RVP of een reis-vaccin voor volwassenen?

EMA: Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

### Tot slot de ingrediënten van de Corona-prik.

Polyethyleenglycol (PEG) is 1 van de hulpstoffen. PEG is nog nooit eerder gebruikt in een goedgekeurd vaccin, maar het wordt aangetroffen in veel geneesmiddelen, die af en toe anafylaxie hebben veroorzaakt - een mogelijk levensbedreigende reactie die huiduitslag, een dalende bloeddruk, kortademigheid en een snelle hartslag kan veroorzaken. Meer informatie over hulpstoffen kunt u vinden via NVKP: [Corona dossier](#), [Vaccindocumenten](#).

Aanvullende informatie: In de zomer van 2021 heeft de NVKP een flyer verspreid om informatie te geven over vaccinatie bij kinderen: - NVKP [Flyer](#) zomer 2021: ‘Belast kinderen niet met een experimentele prik’.